

臍、胆：GEM day1,8,15/4wks

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	グラニセトロンバッグ 100mL	グラニセトロン デキサート	吐き気止め	15分
②	5%ブドウ糖液 100mL	ゲムシタピン	抗がん剤	30分
③	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

- 点滴は1週間に1回で、3週繰り返し、4週目はお休みします。
- 4週間をひとかたまりとして繰り返します。
- 症状によって変更することがあります。

ゲムシタピン | ■□□□□□ | ■□□□□□ | ■□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★★
	口内炎	★		しびれ	★
数日から数週間	食欲不振	★★		爪の変形	★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★		起こりやすさの目安	
	白血球減少	★★★★		★	30%未満
	出血	★		★★	30%~60%
			★★★	60%以上	

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
 投与後1週間~2週間：白血球減少および好中球減少
 投与後3週間：血小板減少

注意点

- 外出時のマスク着用や手洗いうがいなど、感染予防を行ってください。
- ごくまれに間質性肺炎が起こることがあります。
 (初期症状：息切れ、呼吸がしにくい、咳、熱など)
 症状があらわれた場合は、すぐにお知らせください。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。