

膾、胆：GEM+S-1 / 3wks

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	グラニセトロンバッグ 100mL	グラニセトロン デキサート	吐き気止め	15分
②	5%ブドウ糖液 100mL	ゲムシタピン	抗がん剤	30分
③	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)などによって決まります。

のみ薬

作用薬	のみ方	効果
ティーエスワン配合OD錠	1日2回 朝夕食後	抗がん剤

今後の予定

- ゲムシタピンは1週間に1回で、2週繰り返す、3週目はお休みします。
- ティーエスワンは点滴日の夕食後から2週間服用し、1週間休薬します。
- 3週間をひとかたまりとして、繰り返します。
- 症状によって変更することがあります。

ゲムシタピン | ■□□□□□ | ■□□□□□ | □□□□□□ |
 ティーエスワン | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★★
	□内炎	★★		しびれ	★
数日から数週間	食欲不振	★		爪の変形	★
	下痢	★★		色素沈着	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★		起こりやすさの目安	
	白血球減少	★★★★		★ 30%未満	
	出血	★	★★ 30%~60%		
			★★★ 60%以上		

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
 投与後1週間~2週間：白血球減少および好中球減少
 投与後3週間：血小板減少

注意点

- 外出時のマスク着用や手洗いうがいなど、感染予防を行ってください。
- ごくまれに間質性肺炎が起こることがあります。
 (初期症状：息切れ、呼吸がしにくい、咳、熱など)
 症状があらわれた場合は、すぐにお知らせください。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- ティーエスワンの服薬記録表にて、内服確認・副作用チェックを行ってください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。