







膵癌：mFOLFIRINOX/2wks(注射+点滴)

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50mL			15分
②	生理食塩液 100mL	アロカリス パロノセトロン デキサート	吐き気止め	30分
③	5%ブドウ糖液 250mL	エルプラット	抗がん剤	2時間
④ ※側管から ブスコパン+イリリテ カと同時投与	5%ブドウ糖液 250mL	レボホリナート	ガロウラシルの効果 を高める	2時間
④ ※レボホリナートと 同時投与、 1番目	生理食塩液 50mL	ブスコパン	イリリテの副作用 予防	30分
⑤ ※レボホリナートと 同時投与、 2番目	5%ブドウ糖液 250mL	イリリテカン	抗がん剤	90分
⑥	生理食塩液 250mL	フルオロウラシル 持続注	抗がん剤	46時間

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

デカドロン (吐き気止め)	1日目(点滴当日)	2日目		3日目		4日目	
	なし	朝食後 4錠	夕食後 4錠	朝食後 4錠	夕食後 4錠	朝食後 4錠	夕食後 4錠
							

今後の予定

- 点滴は2週間に1回行い、2週間をひとかたまりとして繰り返します。
- 症状によって変更することがあります。

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★★★	数週間以降	貧血	★★★★
	冷たさ過敏	★★★★		しびれ	★★
数日から数週間	口内炎	★★		手足のチクチク感	★
	食欲不振	★★		色素沈着	★
	下痢	★★★★		におい・味覚の変化	★
	便秘	★★		起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%~60% ★★★ 60%以上	
	脱毛	★★			
	白血球減少	★★★★			
出血	★★★★				

注意点

- グレープフルーツジュースを飲むと副作用が強くなるので、お避けください。
- 手洗いうがい・外出時のマスク着用等、感染予防を行ってください。
- 点滴中・点滴後にかゆみ、発疹、息苦しさ等を感じた時はすぐにお知らせください。エルプラットによるアレルギー症状は、初めて点滴したときに現れる場合と、何サイクルか繰り返した後で起こる場合があります。
⇒6回目の点滴より、アレルギー予防のボラミンを追加します。
ボラミンにより眠気が出るので、当日車の運転は避けてください。
- 冷たいものに触れたり飲食したりすると、しびれや痛みを感じるようになります。点滴後1週間ほどは、冷たいものを避けてください。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。