

膝：Nab-PTX+GEM day1,8,15／4wks

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	グラニセトロン バッグ 100mL	グラニセトロン デキサート	吐き気止め	15 分
②	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	15 分
③	生理食塩液 100mL	アブラキサン	抗がん剤	30 分
④	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	15 分
⑤	5%ブドウ糖液 100mL	ゲムシタピン (ジェムザール)	抗がん剤	30 分
⑥	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15 分

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

- 点滴は 1 週間に 1 回で、3 週点滴したあと、4 週目はお休みします。
- 4 週間をひとかたまりとして繰り返します。
- 症状によって変更することがあります。

点滴 | ■□□□□□ | ■□□□□□ | ■□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★★
数日から数週間	口内炎	★		しびれ	★★★★
	食欲不振	★★		関節痛・筋肉痛	★
	下痢	★		爪の変形	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★★		起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%～60% ★★★ 60%以上	
	白血球減少	★★★★			
	血小板減少 (出血傾向)	★★★★			

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
 投与後 1 週間～2 週間：白血球減少および好中球減少
 投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- 外出時のマスク着用や手洗いうがいなど、感染予防を行ってください。
- 手足のしびれがあらわれる場合があります。治療を続けていくと症状が強くなることがありますので、お知らせください。
- 関節痛や筋肉痛が起こる場合があります。その都度お知らせください。
- ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。