

膀胱癌：オニバイド+5-FU+I-LV／2wks(注射アカリス)

点滴

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50mL		ルートキープ用	15分
②	生理食塩液 100mL	アロカリス パロノセトロン デキサート	吐き気止め	30分
③	5%大塚糖液 500mL	オニバイド	抗がん剤	90分
④	生理食塩液 50mL			15分
⑤	5%大塚糖液 250mL	レボホリナート	5-FUの効果を高める	2時間
⑦	生理食塩液	フルオロウラシル 持続注	抗がん剤	46時間

今後の予定

- 点滴は2週間に1回行い、2週間をひとかたまりとして繰り返します。
- 症状によって変更することがあります。

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	悪心、嘔吐	★★★★	数週間以降	貧血	★
	疲労	★		味覚の変化	★
数日から数週間	口内炎	★		色素沈着	★
	食欲不振	★★★★		起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%~60% ★★★ 60%以上	
	下痢	★★			
	便秘	★			
	脱毛	★			
	好中球減少	★★★★			
血小板減少	★				

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
 投与後 1 週間～2 週間：白血球減少および好中球減少
 投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- グレープフルーツジュースを飲むと副作用が強くなることがあるためお避けください。他薬との相互作用も多いため、服用中の薬があれば、薬剤師に相談してください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。