

胆:Durva+GEM+CDDP(SH)/3wks（注射アロカリス）

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液			10 分
②	生理食塩液 250mL	イミフィンジ	抗がん剤	60 分
③	生理食塩液			10 分
④	生理食塩液 100mL	アロカリス パロノセトロン デキサート	吐き気止め	30 分
⑤	生理食塩液 50mL			15 分
⑥	5%ブドウ糖液 250mL	ゲムシタビン	抗がん剤	30 分
⑦	生理食塩液 500mL	シスプラチン	抗がん剤	90 分
⑧	生理食塩液 50mL			15 分
点滴時間				およそ 4 時間 20 分

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

○点滴は 1 週間に 1 回で、2 週繰り返し、3 週目はお休みします。（イミフィンジは 3 週に 1 回投与します。）
○3 週間をひとかたまりとして繰り返します
（症状によって変更することがあります）。

イミフィンジ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |
GEM+CDDP | ■□□□□□ | ■□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用（イミフィンジは冊子を参照）

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★★
数日から数週間	口内炎	★		しびれ	★
	食欲不振	★★		爪の変形	★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★	起こりやすさの目安		
	白血球減少	★★★★			
	出血	★			
			★ 30%未満		
			★★ 30%～60%		
			★★★ 60%以上		

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後 1 週間～2 週間：白血球減少および好中球減少
投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- シスプラチンにより腎臓に負担がかかることがあるため、水分摂取を心がけてください。少なくとも点滴後 3 日間は 1L～1.5L 程度の水分摂取を行ってください。
- 外出時のマスク着用や手洗いうがいなど、感染予防を行ってください。
- ごくまれに間質性肺炎が起こることがあります。
初期症状（息切れ、呼吸がしにくい、咳、熱など）があらわれた場合は、すぐにお知らせください。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。