

子宮・卵巣：DP(SH)／3wks(イメント併用)

点滴

※薬の量はあなたの体格(身長・体重)などによって決まります。

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50 mL	パロノセトロン デキサート	吐き気止め 過敏症予防	30 分
②	生理食塩液 250 mL	ドセタキセル	抗がん剤	1 時間
③	ソルデム1 500 mL	KCL注 硫酸Mg補正液	K、Mg の補充	1 時間
④	マンニトール 300 mL		利尿	1 時間
⑤	生理食塩液 250 mL	シスプラチン	抗がん剤	1 時間
⑥	ソルデム3A 500 mL		水分負荷	1 時間
合計	1850 mL	点滴時間	およそ5時間30分	

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★★	数週間以降	貧血	★
数日から数週間	口内炎	★		しびれ	★
	食欲不振	★★		爪の変形	★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★	起こりやすさの目安		
	白血球減少	★★★	★	30%未満	
	出血	★	★★	30～60%	
			★★★	60%以上	

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後1週間～2週間：白血球減少および好中球減少
投与後3週間：血小板減少

のみ薬

イメントカプセル

デカドロン錠

点滴当日(1日目)	2日目	3日目	4日目
シスプラチン 投与1時間前 	午前中 	午前中 	なし
1回 8錠 を 朝夕食後(3日間)  →			

今後の予定

点滴は3週間に1回です。3週間をひとかたまりとして繰り返します。

注意点

- シスプラチン開始までに1L程度の水分補給を行ってください。
点滴終了後も2日間は水分補給を心がけてください。
- 水分を多めにとり、尿を出して下さい。
- ごく稀に心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れていないか気を付けて下さい。
- その他、何か変わったことがありましたら、すぐにお知らせ下さい。
- 他の病院を受診されるときは この用紙をお持ちになり、抗がん剤で治療中であることを医師にお伝え下さい。

関西労災病院薬剤部