

子宮・卵巣：TC(AUC6)／3wks(イメト併用)

点滴

※薬の量はあなたの体格(身長・体重)などによって決まります。

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	のみくすり⇒ 生理食塩液 50 mL	レスタミン5錠	過敏症予防	30分
		パロノセトロン	吐き気予防	
		デキサート ガスター	過敏症予防	
②	5%糖液 500 mL	パクリタキセル	抗がん剤	3時間
③	5%糖液 250 mL	カルボプラチン	抗がん剤	1時間
④	生理食塩液 50 mL		血管を洗い流す	15分
合計	900 mL	点滴時間	およそ4時間45分	

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
	口内炎	★		しびれ	★★
数日から数週間	食欲不振	★★	爪の変形	★	
	下痢	★	色素沈着	★	
	便秘	★	におい・味覚の変化	★	
	脱毛	★★★	起こりやすさの目安		
	白血球減少	★★★	★ 30%未満		
	出血	★	★★ 30~60%		
			★★★ 60%以上		

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後1週間～2週間：白血球減少および好中球減少
投与後3週間：血小板減少

のみ薬

イメンドカ[®]セル

点滴当日(1日目)	2日目	3日目	4日目
パクリタキセル 投与1時間前 	午前中 	午前中 	なし
デカドロン錠 1日2回 1回4錠を朝夕食後(3日間)  →			

今後の予定

点滴は3～4週間に1回です。3～4週間をひとかたまりとして繰り返します。

注意点

- 点滴にはアルコールが缶ビール1本程度含まれます。
- レスタミン錠の副作用で眠気が出る場合があります。(外来で治療を受けるとき、車の運転は避けて下さい。)
- ごく稀に心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れていないか気を付けて下さい。
- その他、何か変わったことがありましたら、すぐにお知らせ下さい。
- 他の病院を受診されるときは この用紙をお持ちになり、抗がん剤で治療中であることを医師にお伝え下さい。