

卵巣:Bmab/3wks

点滴

※薬の量はあなたの体格(身長・体重)などによって決まります。

1日目

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50 mL			15分
②	生理食塩液 100 mL	アバスチン	抗がん剤	
③	生理食塩液 50 mL		血管を洗い流す	15分
合計500mL		点滴時間	3時間30分→3時間→2時間30分	

アバスチンの点滴時間は、
初回90分→2回目60分→3回目～
30分と徐々に短縮していきます。
(※点滴時に問題がない場合)

今後の予定

点滴は3週間に1回行います。3週間をひとかたまりとして繰り返します。

症状によって変更することがあります。

1週目

2週目

3週目

アバスチン | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用

- 高血圧
- タンパク尿(尿にタンパクがでる)
- 粘膜からの出血(鼻血、歯ぐきからの出血)
- 白血球数・好中球減少(菌やウイルスなどに対する抵抗力の低下)

注意点

- 血圧の上昇、足のむくみ、腹部痛、吐き気、手足の痛みなどが出現した時は、すぐにお知らせください。
⇒「アバスチン緊急連絡カード」を常に携帯しておいてください。
- 点滴中は点滴が漏れていないか気を付けて下さい。
- その他、何か変わったことがありましたら、すぐにお知らせ下さい。
- 他の病院を受診される時は この用紙をお持ちになり、抗がん剤で治療中であることを医師にお伝え下さい。

関西労災病院薬剤部