

卵巣: Doxi+Carbo+Bmab/4wks(イムド併用)

点滴

※薬の量はあなたの体格(身長・体重)などによって決まります。

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	5%大塚糖液 100 mL	パロノセトロン デキサート	吐き気予防 過敏症予防	30分
②	5%大塚糖液 250 mL	ドキシル *	抗がん剤	90分
③	5%大塚糖液 100 mL			30分
④	5%大塚糖液 250 mL	カルボプラチン	抗がん剤	1時間
⑤	生理食塩液 50 mL		血管を洗い流す	15分
⑥	生理食塩液 100 mL	アバスチン	抗がん剤	
⑦	生理食塩液 50 mL		血管を洗い流す	15分
合計750mL		点滴時間	5時間30分→5時間→4時間30分	

- \* ②の間は手足首を冷却します。
- \* 点滴前にトイレを済ませておいて下さい。

アバスチンの点滴時間は、  
初回90分→2回目60分→3回目～30分  
と徐々に短縮していきます。  
(※点滴時に問題がない場合)

主な副作用




時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★★
	口内炎	★★★★		しびれ	★
数日から数週間	手足症候群 **	★★★★	爪の変形	★	
	下痢	★	色素沈着	★	
	便秘	★	におい・味覚の変化	★	
	脱毛	★	起こりやすさの目安		
	白血球減少	★★★★	★	30%未満	
	出血	★★	★★	30~60%	
			★★★	60%以上	

\*\* 手足症候群は手や足の皮膚の細胞が障害されることで起こる副作用です。

- ※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。  
投与後1週間～2週間: 白血球減少および好中球減少  
投与後3週間: 血小板減少

※ アバスチンの副作用に関しては、アバスチンハンドブックを参考にして下さい。

のみ薬

	点滴当日(1日目)	2日目	3日目	4日目
イムドカプセル	ドキシル 投与1時間前 	午前中 	午前中 	なし
デカドロン錠	1日2回 1回4錠を朝夕食後(3日間) 			→

今後の予定

点滴は4週間に1回行います。症状によって変更することがあります。

注意点

- 投与前日から投与後5日間は、手足や皮膚に摩擦や圧力がかかることは避けて下さい。治療ガイドブックに詳しく記載してあります。
- 点滴後24時間(特に最初の2時間)は過敏症状(ほてり 息苦しいなど)が起こることがあります。
- 点滴後1日くらいは尿が赤くなりますが、心配ありません。
- ごく稀に心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れていないか気を付けて下さい。
- その他、何か変わったことがありましたら、すぐにお知らせ下さい。
- 他の病院を受診される時は この用紙をお持ちになり、抗がん剤で治療中であることを医師にお伝え下さい。