

卵巣:wPTX(day1,8,15)+Bmab／3wks

点滴

※薬の量はあなたの体格(身長・体重)などによって決まります。

1日目

順序	輸液	作用薬	効果	時間
	のみくすり⇒	レスタミン5錠	過敏症予防	
①	生理食塩液 50 mL	デキサート ガスター	吐き気予防 過敏症予防	30 分
②	5%糖液 250 mL	パクリタキセル	抗がん剤	1 時間
③	生理食塩液 50 mL		血管を洗い流す	15 分
④	生理食塩液 100 mL	アバスチン	抗がん剤	
⑤	生理食塩液 50 mL		血管を洗い流す	15 分
合計500mL		点滴時間	3時間30分→3時間→2時間30分	

アバスチンの点滴時間は、
初回90分→2回目60分→3回目～
30分と徐々に短縮していきます。
(※点滴時に問題がない場合)

8、15日目

順序	輸液	作用薬	効果	時間
	のみくすり⇒	レスタミン5錠	過敏症予防	
①	生理食塩液 50 mL	デキサート ガスター	吐き気予防 過敏症予防	30 分
②	5%糖液 250 mL	パクリタキセル	抗がん剤	1 時間
③	生理食塩液 50 mL		血管を洗い流す	15 分
合計	350 mL	点滴時間	およそ1時間45分	

今後の予定

点滴は1週間に1回3週間連続して行います。3週間をひとかたまりとして繰り返します。
症状によって変更することがあります。

1週目

2週目

3週目

パクリタキセル | ■□□□□□ | ■□□□□□ | ■□□□□□ |

アバスチン | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
数日から数週間	口内炎	★		しびれ	★★
	食欲不振	★★		爪の変形	★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★	起こりやすさの目安		
	白血球減少	★★★	★ 30%未満		
	出血	★	★★ 30～60%		
			★★★ 60%以上		

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後1週間～2週間:白血球減少および好中球減少
投与後3週間:血小板減少

注意点

- 点滴にはアルコールがビールでコップ1杯程度含まれます。
 - レスタミン錠の副作用で眠気が出る場合があります。
(外来で治療を受けるとき、車の運転は避けて下さい。)
 - ごく稀に心臓に負担がかかることがあります。
 - 点滴中は点滴が漏れていないか気を付けて下さい。
 - その他、何か変わったことがありましたら、すぐにお知らせ下さい。
 - 血圧の上昇、足のむくみ、腹部痛、吐き気、手足の痛みなどが
出現した時は、すぐにお知らせください。
- ⇒「アバスチン緊急連絡カード」を常に携帯しておいてください。
- 他の病院を受診されるときは この用紙をお持ちになり、抗がん剤で治療中であることを医師にお伝え下さい。