

尿路上皮：wGC／4wks

点滴

1日目

順序	輸液	作用薬	作用	点滴時間
①	ソリューゲンF 500mL			
②	生理食塩液 50mL	パロノセトロン デキサート	吐き気止め	30分
③	生理食塩液 100mL	ゲムシタビン	抗癌剤	30分
④	5%ブドウ液 250mL	カルボプラチン	抗癌剤	1時間
⑤	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す	15分


8日目、15日目

順序	輸液	作用薬	作用	点滴時間
①	ソリューゲンF 500mL			
②	生理食塩液 50mL	デキサート	吐き気止め	30分
③	生理食塩液 100mL	ゲムシタビン	抗癌剤	30分
④	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す	15分

- ※ ソリューゲンF（電解質輸液）でルートキープ
- ※ 薬の量はあなたの体格（身長・体重）によって決まります。

今後の予定

- ゲムシタビンは1週間に1回点滴し、4週目はお休みします。
（1日目、8日目、15日目）
- カルボプラチンは4週間に1回で1日目に行います。
- 1クール4週間となります。
- 症状によって変更することがあります。



主な副作用

副作用	起こりやすさ	副作用	起こりやすさ
脱毛	★	白血球減少	★★★
吐き気・嘔吐	★★	発熱	★★
口内炎	★	下痢	★
食欲不振	★★	しびれ 筋肉・関節痛	★★
体のだるさ	★★	出血傾向	★★

※ 副作用の出かたには個人差があります。

注意点

- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。