

非ホゾキ：リツキシマブ 単剤day1/wk×4回（ソルコ-テフ入り）

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	-	ポララミン	過敏反応の予防	（静注）
②	生理食塩液 50mL	ソルコ-テフ	ステロイド	15分
③	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す （炎症を予防）	15分
④	生理食塩液 500mL	リツキシマブ	分子標的薬	4時間 以上
⑤	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す （炎症を予防）	15分

※ 薬の量はあなたの体格（身長・体重）などによって決まります。

- 点滴は1週間に1回行う予定です。

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
当日	発熱	★★★	数週間以降	白血球減少 好中球減少 血小板減少	★
	悪寒	★★★			
	かゆみ・発疹	★			
	頭痛	★			
	ほてり	★			
	発汗	★	起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30~60% ★★★ 60%以上		
	血圧上昇 頻脈	★			
	倦怠感	★			

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。

注意点

- 水分を多めに摂り、尿を出して下さい。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- リツキシマブの副作用の多くは、初めての治療中に起こり、治療が終わる頃まで、遅くとも1日たてばほとんどの症状がなくなるか軽くなります。2回目以降の治療では、副作用は減少しますが、2回目以降に初めて副作用があらわれる場合や、それまでとは違う副作用があらわれる場合があります。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。
- 他の病院にかかれるときはこの用紙をお持ちになり、抗癌剤で治療中であることを医師にお伝えください。