

NSCLC : CBDCA+VNR / 3wks

点滴

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

1日目

順序	輸液	作用薬	作用	点滴時間
①	生理食塩液 50mL	パロノセトロン	吐き気止め	15分
②	生理食塩液 50mL	ロゼウス	抗がん剤	5分
③	ソルデム 3A 200mL	デキサート	血管を洗い流す (炎症予防) 吐き気止め	30分
④	5%ブドウ液 250mL	カルボプラチン	抗がん剤	1時間
⑤	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分
合計	600mL	点滴時間 およそ2時間5分		

8日目

順序	輸液	作用薬	作用	点滴時間
①	生理食塩液 50mL		(点滴ルート確保)	15分
②	生理食塩液 50mL	ロゼウス	抗がん剤	5分
③	ソルデム 3A 200mL	デキサート	血管を洗い流す (炎症を予防)	30分
合計	300mL	点滴時間 およそ50分		

飲み薬

	のみ方	効果
デカドロン錠 0.5mg	1日2回 朝夕食後に8錠ずつ (点滴した翌日から開始) : 2日間	吐き気止め

○3週間をひとかたまりとして繰り返します。

○症状によって、変更することがあります。

ロゼウス | ■□□□□□ | ■□□□□□ | □□□□□□ |
カルボプラチン | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
	口内炎	★		しびれ	★★
数日から数週間	食欲不振	★★		爪の変形	★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★	起こりやすさの目安		
	白血球減少	★★★	★ 30%未満		
	出血傾向 (血小板減少)	★	★★ 30%~60%		
			★★★ 60%以上		

※ 副作用の出かたには個人差があります。

投与後 1週間~2週間：白血球減少および好中球減少

投与後 3週間：血小板減少

注意点

○外出時のマスク着用や手洗いうがいなど、感染予防を行ってください。

○点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。

注射部位に痛み・赤み・腫れなどの症状があれば知らせてください。

点滴が漏れていない場合でも、静脈炎や血管痛が起こることがあります。数時間から数日後に症状があらわれることもあるので、気になる症状があればお知らせください。

○その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。