

NSCLC：Ipi+Niv+PEM+CBDCA/6wks

点滴

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

1日目、22日目(ヤーポイは1日目のみ投与)に点滴します

順序	輸液	作用薬	作用	点滴時間
①	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	10分
②	生理食塩液 100mL	オブジーボ	抗がん剤	30分
③	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	15分
④	生理食塩液 50mL	ヤーポイ	抗がん剤	30分
⑤	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	15分
⑥	生理食塩液 50mL	パロノセトロン デキサート	吐き気止め	15分
⑦	生理食塩液 100mL	ペメトレキシド	抗がん剤	10分
⑧	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	15分
⑨	5%ブドウ液 250mL	カルボプラチン	抗がん剤	1時間
⑩	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	10分

飲み薬

2、3日目、23、24日目	のみ方	効果
デカドロン錠	1日2回 2日間服用 (点滴した翌日から開始)	吐き気止め

○6週間をひとかたまりとして繰り返します。
○症状によって、変更することがあります。

ヤーポイ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |
オブジーボ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |
ペメトレキシド | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |
カルボプラチン | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用 (Ipi+Niv は冊子)

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★★
数日から数週間	口内炎	★		しびれ	★
	食欲不振	★★		筋肉痛・関節痛	★
	下痢	★		爪の変形	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★	起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%～60% ★★★ 60%以上		
	白血球減少	★★★			
	出血傾向 (血小板減少)	★★			

※ 副作用の出かたには個人差があります。
投与後 1 週間～2 週間：白血球減少および好中球減少
投与後 3 週間：血小板減少

注意点

○外出時のマスク着用や手洗いうがいなど、感染予防を行ってください。
○手足のしびれがあらわれる場合があります。治療を続けていくと症状が強くなることがありますので、お知らせください。
○関節痛や筋肉痛が起こる場合があります。痛み止めの薬を用意できますので、その都度お知らせください。
○パンビタンは連日服用、メチコバルは9週間に1回注射します。
○ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。
○点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
○その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。