

NSCLC：PEM／3wks

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 100mL	デキサート	吐き気止め	15 分
②	生理食塩液 100mL	ペメトレキシド	抗がん剤	10 分
③	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15 分
合計	250mL	点滴時間 およそ 40 分		

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

- 3 週間ごとに点滴をする予定です。
- 症状によって変更することがあります。
- ★副作用予防にパンビタン末を毎日忘れずに服用してください。
- ★副作用予防にメチコバル注射を 9 週間ごとに行います。

ペメトレキシド | ■□□□□□□ | □□□□□□□ | □□□□□□□

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★★
数日から数週間	口内炎	★		しびれ	★
	食欲不振	★★		爪の変形	★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★	起こりやすさの目安		
	白血球減少	★★★★			
	血小板減少 (出血傾向)	★★			
			★	30%未満	
			★★	30%～60%	
			★★★★	60%以上	

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後 1 週間～2 週間：白血球減少および好中球減少
投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- 発熱、咳、呼吸困難感（間質性肺炎の初期症状）等がありましたら、すぐにお知らせください。
- 感染予防を行ってください。（外出時のマスク着用、手洗いうがい等）
- 点滴中は、点滴が漏れていないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。