

NSCLC : weeklyNab-PTX+CBDCA / 3wks

点滴

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

1日目

順序	輸液	作用薬	作用	点滴時間
①	生理食塩液 50mL	パロノセトロン デキサート	吐き気止め	15分
②	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	15分
③	生理食塩液 50mL	アブラキサン	抗がん剤	30分
④	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	15分
⑤	5%ブドウ液 250mL	カルボプラチン	抗がん剤	1時間
⑥	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分

8日目、15日目

順序	輸液	作用薬	作用	点滴時間
①	生理食塩液 50mL	デキサート	吐き気止め	15分
②	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	15分
③	生理食塩液 50mL	アブラキサン	抗がん剤	30分
④	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分

飲み薬

2、3日目	のみ方	効果
デカドロン錠 0.5mg	1日2回 朝食後に 8錠ずつ (点滴した翌日から開始) : 2日間	吐き気止め

○3週間をひとかたまりとして繰り返します。

○症状によって、変更することがあります。

アブラキサン | ■□□□□□ | ■□□□□□ | ■□□□□□ |
カルボプラチン | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★★
	口内炎	★		しびれ	★★
数日から数週間	食欲不振	★★		筋肉痛・関節痛	★
	下痢	★		爪の変形	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★		起こりやすさの目安	
	白血球減少	★★★★		★ 30%未満	
	出血傾向 (血小板減少)	★★	★★ 30%~60%		
		★★★ 60%以上			

※ 副作用の出かたには個人差があります。

投与後 1週間~2週間：白血球減少および好中球減少

投与後 3週間：血小板減少

注意点

○外出時のマスク着用や手洗いうがいなど、感染予防を行ってください。

○手足のしびれがあらわれる場合があります。治療を続けていくと症状が強くなる場合がありますので、お知らせください。

○関節痛や筋肉痛が起こる場合があります。痛み止めの薬を用意できますので、その都度お知らせください。

○ごくまれに心臓に負担がかかる場合があります。

○点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。

○その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。