

NSCLC：アテゾ リズ マブ +TC+BEV／3wks

点滴・のみ薬

1 日目	輸液	作用薬	作用	点滴時間
①	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す	10 分
②	生理食塩液 250mL	テセントリク	抗がん剤	60 分 ⇒30 分
③	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す	10 分
④	(のみ薬) ⇒	レスタミン錠 5 錠	過敏症予防	
	生理食塩液 50mL	アロキシ デキサート ガスター	吐き気止め 過敏症予防	30 分
⑤	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す	30 分
⑥	5%ブドウ液 500mL	パクリタキセル	抗がん剤	3 時間
⑦	5%ブドウ液 250mL	カルボプラチン	抗がん剤	1 時間
⑧	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す	10 分
⑨	生理食塩液 100mL	ベバシズマブ	抗がん剤	90 分 ⇒60 分 ⇒30 分
⑩	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	10 分

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

3 週間をひとかたまりとして繰り返します（症状によって変更することがあります）。

テセントリク | ■□□□□□□ | □□□□□□□ | □□□□□□□ |
パクリタキセル | ■□□□□□□ | □□□□□□□ | □□□□□□□ |
カルボプラチン | ■□□□□□□ | □□□□□□□ | □□□□□□□ |
ベバシズマブ | ■□□□□□□ | □□□□□□□ | □□□□□□□ |

主な副作用（テセントリクは冊子参照）

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★★	数週間以降	貧血	★
数日から数週間	口内炎	★		しびれ	★★★
	食欲不振	★★★		爪の変形	★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★★		起こりやすさの目安	
	白血球減少	★★★★		★	30%未満
	出血	★		★★	30%～60%
				★★★★	60%以上

※ 副作用の出かたには個人差があります。
投与後 1 週間～2 週間：白血球減少および好中球減少
投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- 点滴には、アルコールがビールに換算して約 500mL 程度含まれます。
- 2 日目、3 日目にデカドロンを服用していただきます。（1 回 8 錠）
- レスタミンの副作用で眠気が出る場合があります。（外来で治療を受けるとき、車の運転は避けてください。）
- 点滴の回数が増えると、手足のしびれが強く感じられることがあります。その都度お知らせください。
- 血圧の上昇、足のむくみ、腹部痛、吐き気、手足の痛みなどが出現したときは、すぐにお知らせください。
⇒「ベバシズマブ緊急連絡カード」を常に携帯してください。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。