

SCLC : CDDP(SH)+VP-16/4wks (注射アカリス)

点滴

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

1 日目

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 100mL	アカリス、パロセチン、デキサート	吐き気止め	30分
②	生理食塩液 500mL	エトポシド	抗がん剤	90分
③	ソルデム 1 500mL	KCL、硫酸 Mg	K、Mg の補充	60分
④	マンニトール 300mL		利尿剤	60分
⑤	生理食塩液 250mL	シスプラチン	抗がん剤	60分
⑥	ソルデム 3 500mL		血管を洗い流す	60分

2 日目、3 日目

順序	輸液	作用薬	作用	時間
①	生理食塩液 50mL	デキサート	吐き気止め	15分
②	生理食塩液 500mL	エトポシド	抗がん剤	90分
③	生理食塩液 1000mL		水分補給	180分

飲み薬

デカドロン 0.5mg (吐き気止め)	1 日目 なし	2 日目 なし	3 日目 なし	4 日目 朝食後 8錠 昼食後 8錠

- 点滴は 4 週間に 1 回行います。
- 症状によって変更することがあります。

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★★	数週間以降	貧血	★
	口内炎	★		しびれ	★
数日から数週間	食欲不振	★★		爪の変形	★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★		起こりやすさの目安	
	白血球減少	★★★	★ 30%未満		
	血小板減少 (出血傾向)	★	★★ 30%~60%		
			★★★ 60%以上		

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後 1 週間~2 週間：白血球減少および好中球減少
投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- シスプラチン開始までに 1L 程度の水分補給を行ってください。
- 発熱、咳、呼吸困難感(間質性肺炎の初期症状)等がありましたら、すぐにお知らせください。
- 感染予防を行ってください。(外出時のマスク着用、手洗いうがい等)
- エトポシドによる血管炎が起こる場合があります。
投与中に血管痛などの症状があれば、すぐにお知らせください。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- 外出時のマスク着用や手洗いうがいなど、感染予防を行ってください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。