

NSCLC：CDDP(SH)+VNR/3wks（注射A加入）

点滴

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

1 日目

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50mL			15 分
②	生理食塩液 50mL	ロゼウス	抗がん剤	5 分
③	ソルデム 3A 200mL	アロカリス、パロノセトロン、デキサート	吐き気止め	30 分
④	生理食塩液 50mL			15 分
⑤	ソルデム 1 500mL	KCL、硫酸 Mg	K、Mg の補充	60 分
⑥	マンニトール 300mL		利尿剤	60 分
⑦	生理食塩液 250mL	シスプラチン	抗がん剤	60 分
⑧	ソルデム 3 500mL		血管を洗い流す	60 分
合計	1900mL	点滴時間：5 時間 05 分		

8 日目

順序	輸液	作用薬	作用	時間
①	生理食塩液 50mL			15 分
②	生理食塩液 50mL	ロゼウス	抗がん剤	5 分
③	ソルデム 3A 200mL	デキサート	血管を洗い流す （炎症を予防）	30 分
合計	300mL	点滴時間 およそ 50 分		

のみ薬

○点滴翌日から 3 日間、デカドロンを併用します。

○3 週間をひとかたまりとして繰り返します。

○症状によって、変更することがあります。

ロゼウス | ■□□□□□ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |
シスプラチン | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★★	数週間以降	貧血	★★
数日から数週間	口内炎	★		しびれ	★
	食欲不振	★★★		爪の変形	★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★	起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%～60% ★★★ 60%以上		
	白血球減少	★★			
	血小板減少 （出血傾向）	★			

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後 1 週間～2 週間：白血球減少および好中球減少
投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- シスプラチン開始までに 1L 程度の水分補給を行ってください。
- 発熱、咳、呼吸困難感（間質性肺炎の初期症状）等がありましたら、すぐにお知らせください。
- 感染予防を行ってください。（外出時のマスク着用、手洗いうがい等）
- 点滴中は、点滴が漏れていないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。