

NSCLC：RAM+DTX/3wks

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50mL	デキサート ポラミン	吐き気止め アレルギー予防	30 分
②	生理食塩液 250mL	サイラムザ	抗がん剤	60 分 (→30 分)
③	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	60 分 (→30 分)
④	5%ブドウ糖液 250mL	ドセタキセル	抗がん剤	60 分
⑤	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15 分
合計	650mL	点滴時間 およそ 3 時間 45 分 (2 回目以降 およそ 2 時間 45 分)		

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

- 点滴は 3 週間に 1 回の予定です。
- 症状によって変更することがあります。

ドセタキセル | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |
サイラムザ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★★
数日から数週間	口内炎	★		関節痛・筋肉痛	★★
	食欲不振	★★		手足のむくみ	★★
	下痢	★		たんぱく尿	★
	便秘	★★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★★		起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%～60% ★★★ 60%以上	
	白血球減少	★★★★			
	出血	★			

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後 1 週間～2 週間：白血球減少および好中球減少
投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- ポラミンの副作用で眠気が出る場合があります。
(外来で治療を受けるとき、車の運転はお避けください)
- 治療を続けていると血圧が上昇することがあります。
自宅でも血圧測定を継続し、日誌に記載してください。
- 手洗いうがい・外出時のマスク着用等、感染予防を行ってください。
- ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。