

乳腺：AC／3wks（注射アカリス）

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 250mL	アロカリス パロノセトロン デキサート	吐き気止め	30 分
②	生理食塩液 50mL			5 分
③	5%ブドウ糖液 100mL	ドキシソルピシン	抗がん剤（赤色）	15 分
④	生理食塩液 100mL	エンドキサン	抗がん剤	15 分
⑤	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す （炎症を予防）	15 分
点滴時間 およそ 1 時間 20 分				

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

のみ薬

	1 日目（点滴当日）	2 日目以降
デカドロン （吐き気止め）	なし	 1 日 2 回朝夕食後 1 回 1 錠（3 日間）
イリマ® ライール （消化性潰瘍予防）	なし	 1 日 1 回朝食後 1 回 1 カプセル（7 日間）

今後の予定

- 点滴は 3 週間に 1 回で、4 回繰り返します。
 - 症状によって変更することがあります。
- 点滴 | ■□□□□□□ | □□□□□□□ | □□□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
数日から数週間	口内炎	★★		しびれ	★
	食欲不振	★★		爪の変形	★★
	下痢	★		色素沈着	★★
	便秘	★★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★★	起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%～60% ★★★ 60%以上		
	白血球減少	★★★★			
	出血	★			

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後 1 週間～2 週間：白血球減少および好中球減少
投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- 口内炎予防のために③の点滴前から氷片を口に含んでください。
- 水分を多めにとり、尿を出してください。
- 点滴後 1 日くらいは尿が赤くなりますが、心配ありません。
- ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。

※退院時には発熱した場合（38℃以上）の抗生剤の飲み薬をお渡しします。