




乳腺：ddAC/2wks（注射アカリス）

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 250mL	アロカリス パロノセトロン デキサート	吐き気止め	30分
②	生理食塩液 50mL			5分
③	5%ブドウ糖液 100mL	ドキシソルピシン	抗がん剤（赤色）	15分
④	生理食塩液 100mL	エンドキサン	抗がん剤	15分
⑤	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す （炎症を予防）	15分
点滴時間 およそ1時間20分				

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

のみ薬

デカドロン (吐き気止め)	1日目(点滴当日)	2日目		3日目		4日目	
	なし	朝食後 8錠	夕食後 8錠	朝食後 8錠	夕食後 8錠	朝食後 8錠	夕食後 8錠
							

今後の予定

- 点滴は2週間に1回行います。
- 2週間を1クールとして、4クール行います（術前・術後）。
- 翌日以降にジューラスト皮下注を投与します。
- 症状によって変更することがあります。

点滴 | ■□□□□□□□ | □□□□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
	口内炎	★★		しびれ	★
数日から数週間	食欲不振	★★		爪の変形	★★
	下痢	★		色素沈着	★★
	便秘	★★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★★	起こりやすさの目安		
	白血球減少	★★★★	★	30%未満	
	出血	★	★★	30%~60%	
			★★★	60%以上	

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
 投与後1週間~2週間：白血球減少および好中球減少
 投与後3週間：血小板減少

注意点

- 口内炎予防のために③の点滴前から氷片を口に含んでください。
- 水分を多めにとり、尿を出してください。
- 点滴後1日くらいは尿が赤くなりますが、心配ありません。
- ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。

※退院時には発熱した場合（38℃以上）の抗生剤の飲み薬をお渡しします。