

乳腺：ddPTX／2wks

点滴・のみ薬

	輸液	作用薬	効果	点滴時間
①	(のみ薬)	レスタミン錠 5 錠	アレルギー予防	
	生理食塩液 50mL	デキサート ガスター	吐き気止め アレルギー予防	30 分
②	5%ブドウ糖液 500mL	パクリタキセル	抗がん剤	3 時間
③	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15 分
合計	600mL	点滴時間 およそ 3 時間 45 分		

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

- 点滴は 2 週間に 1 回行います。
- 2 週間を 1 クールとして、4 クール行います（術前・術後）。
- 翌日以降にジューラスト皮下注を投与します。
- 症状によって変更することがあります。

パクリタキセル | ■□□□□□□ | □□□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
数日から数週間	口内炎	★		しびれ	★★
	食欲不振	★★		爪の変形	★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★	起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%～60% ★★★ 60%以上		
	白血球減少	★★★			
	出血	★			

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後 1 週間～2 週間：白血球減少および好中球減少
投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- 点滴にはアルコールが含まれます。
- レスタミンの副作用で眠気が出る場合があります。
（外来で治療を受けるとき、車の運転はお避けください）
- 関節痛やしびれが起こる場合があります。
その都度お知らせください。
- ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。

※退院時には発熱した場合（38℃以上）の抗生剤の飲み薬をお渡しします。