

乳腺：DTX60／3wks

点滴・のみ薬

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	(のみ薬)	レスタミン錠 5錠	アレルギー予防	
	生理食塩液 50mL	デキサート ガスター	吐き気止め アレルギー予防	30分
②	5%ブドウ糖液 250mL	ドセタキセル	抗がん剤	60分
③	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分
合計	350mL	点滴時間 およそ1時間45分		

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

- 点滴は3週間に1回の予定です。
- 症状によって変更することがあります。

ドセタキセル | ■□□□□□□ | □□□□□□□ | □□□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★★
	□内炎	★		関節痛・筋肉痛	★★
数日から数週間	食欲不振	★★		手足のむくみ	★★
	下痢	★		爪の変形	★
	便秘	★★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★★	起こりやすさの目安		
	白血球減少	★★★★	★ 30%未満		
出血	★	★★ 30%~60%			
		★★★ 60%以上			

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
 投与後1週間~2週間：白血球減少および好中球減少
 投与後3週間：血小板減少

注意点

- レスタミンの副作用で眠気が出る場合があります。
(外来で治療を受けるとき、車の運転はお避けください)
- ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。

※退院時には発熱した場合(38℃以上)の抗生剤の飲み薬をお渡しします。