

乳腺：EC／3wks（注射アカサ）

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 250mL	アロカリス パロノセトロン デキサート	吐き気止め	30分
②	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す	5分
③		エピルピシン	抗がん剤（赤色）	5分
④	生理食塩液 100mL	エンドキサン	抗がん剤	15分
⑤	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す （炎症を予防）	15分
点滴時間 およそ1時間10分				

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

のみ薬

	1日目（点滴当日）	2日目以降
デカドロン （吐き気止め）	なし	 1日2回朝食後 1回1錠（3日間）
イソップラール （消化性潰瘍予防）	なし	 1日1回朝食後 1回1カプセル（7日間）

今後の予定

- 点滴は3週間に1回の予定です。
- 症状によって変更することがあります。

点滴 | ■□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
	口内炎	★		しびれ	★
数日から数週間	食欲不振	★★		爪の変形	★★
	下痢	★		色素沈着	★★
	便秘	★★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★★		起こりやすさの目安	
	白血球減少	★★★★	★ 30%未満		
	出血	★	★★ 30%～60%		
			★★★ 60%以上		

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後1週間～2週間：白血球減少および好中球減少
投与後3週間：血小板減少

注意点

- 口内炎予防のために③の点滴前から氷片を口に含んでください。
- 水分を多めにとり、尿を出してください。
- 点滴後1日くらいは尿が赤くなりますが、心配ありません。
- ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。

※退院時には発熱した場合（38℃以上）の抗生剤の飲み薬をお渡しします。