

乳腺：TC/3wks

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	(のみぐすり)	レスタミン錠 5錠	アレルギー予防	30分
	グラニセトロン バッグ 100mL	グラニセトロン デキサート ガスター	吐き気止め 浮腫予防 アレルギー予防	
②	5%ブドウ糖液 250mL	ドセタキセル	抗がん剤	1時間
③	生理食塩液 100mL	エンドキサン	抗がん剤	15分
④	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分
合計	500mL	点滴時間 およそ 2時間		

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

のみ薬

	1日目(点滴当日)	2日目以降
デカドロン (吐き気止め)	なし	 1日2回朝食後 1回1錠 (3日間)

今後の予定

○点滴は3週間に1回で、4回繰り返します。
○症状によって変更することがあります。

点滴 | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
	口内炎	★		関節痛・筋肉痛	★★
数日から数週間	食欲不振	★★		手足のむくみ	★★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★★		起こりやすさの目安	
	白血球減少	★★★★		★ 30%未満	
出血	★	★★ 30%~60%			
			★★★ 60%以上		

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後 1週間~2週間：白血球減少および好中球減少
投与後 3週間：血小板減少

注意点

- 水分を多めにとり、尿を出してください。(膀胱炎の予防)
- レスタミンの副作用で眠気が出る場合があります。
(外来で治療を受けるとき、車の運転はお避けください)
- ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。

※退院時には発熱した場合(38℃以上)の抗生剤の飲み薬をお渡しします。