

乳腺：wPTX+AVA/4wks

点滴・のみ薬

1,3週目	2週目	輸液	作用薬	効果	点滴時間
①	①	(のみ薬)	レスタミン錠 5錠	アレルギー予防	30分
		生理食塩液 50mL	デキサート ガスター	吐き気止め アレルギー予防	
②	②	5%ブドウ糖液 250mL	パクリタキセル	抗がん剤	1時間
③	—	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	15分
④	—	生理食塩液 100mL	アバスチン	抗がん剤	90分 ⇒60分 ⇒30分
⑤	③	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

- パクリタキセルは、1週間に1回点滴し、4週目はお休みします。
- アバスチンは、2週間に1回点滴します。
- 4週間をひとかたまりとして繰り返す予定です。
- 症状によって変更することがあります。

パクリタキセル | ■□□□□□ | ■□□□□□ | ■□□□□□ | □□□□□□ |
 アバスチン | ■□□□□□ | □□□□□□ | ■□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
	口内炎	★		しびれ	★★
数日から数週間	食欲不振	★★		爪の変形	★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★	におい・味覚の変化	★	
	脱毛	★★★	起こりやすさの目安		
	白血球減少	★★★	★ 30%未満		
	出血	★	★★ 30%~60%		
			★★★ 60%以上		

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
 投与後 1 週間~2 週間：白血球減少および好中球減少
 投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- パクリタキセルにはアルコールが含まれます。
(ビールに換算してコップ 1 杯程度)
- レスタミンの副作用で眠気が出る場合があります。
(外来で治療を受けるとき、車の運転はお避けください)
- 血圧の上昇、足のむくみ・痛み、腹部痛、吐き気などが出現した時は、すぐにお知らせください。
⇒「アバスチン緊急連絡カード」を常に携帯しておいてください。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。