

# 乳腺： $\Delta$ プロリス マブ + AC / 3wks (注射アロカリス)

## 点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50mL		ルートキープ	15分
②	生理食塩液 100mL	キイトルーダ	抗がん剤	30分
③	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	15分
④	生理食塩液 100mL	アロカリス パロノセトロン デキサート	吐き気止め	30分
⑤	生理食塩液 50mL			5分
⑥	5%ブドウ糖液 100mL	ドキシソルピシン	抗がん剤 (赤色)	15分
⑦	生理食塩液 100mL	エンドキサン	抗がん剤	15分
⑧	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分
点滴時間 およそ 2 時間 20 分				

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

## のみ薬

	1日目 (点滴当日)	2日目以降
デカドロン (吐き気止め)	なし	 1日2回朝食後 1回1錠 (3日間)
エソメプラゾール (消化性潰瘍予防)	なし	 1日1回朝食後 1回1カプセル (7日間)

## 今後の予定

○点滴は3週間に1回で、4回繰り返します。

○症状によって変更することがあります。 点滴 | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |

## 主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★★	数週間以降	貧血	★★
	口内炎	★		しびれ	★
数日から数週間	食欲不振	★		爪の変形	★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★		起こりやすさの目安	
	好中球減少	★★		★ 30%未満	
	出血	★	★★ 30%~60%		
			★★★ 60%以上		

※ キイトルーダの副作用に関しては、治療ハンドブックを参考にしてください。

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。

投与後 1 週間~2 週間：白血球減少および好中球減少

投与後 3 週間：血小板減少

## 注意点

○口内炎予防のために⑥の点滴前から氷片を口に含んでください。

○水分を多めにとり、尿を出してください。

○点滴後 1 日くらいは尿が赤くなりますが、心配ありません。

○ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。

○点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。

○その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。