

乳腺： \wedge Δ ρ σ τ ν μ +PTX+CBDCA(weekly)/3wks

点滴・のみ薬

1 週目	2,3 週目	輸液	作用薬	効果	点滴時間
①	—	生理食塩液 50mL		ルートキープ	15 分
②	—	生理食塩液 100mL	キイトルーダ	抗がん剤	30 分
③	—	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	15 分
④	①	(のみ薬)	レスタミン錠 5 錠	アレルギー予防	
		生理食塩液 50mL	パロノセトロン デキサート ガスター	吐き気止め アレルギー予防	30 分
⑤	②	5%ブドウ糖液 250mL	パクリタキセル	抗がん剤	1 時間
⑥	③	5%ブドウ糖液 250mL	カルボプラチン	抗がん剤	1 時間
⑦	④	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15 分

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

- キイトルーダは、3週間に1回点滴します。
- パクリタキセル、カルボプラチンは、1週間に1回点滴します。
- 3週間をひとかたまりとして繰り返す予定です。
- 症状によって変更することがあります。

キイトルーダ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |
 パクリタキセル | ■□□□□□ | ■□□□□□ | ■□□□□□ |
 カルボプラチン | ■□□□□□ | ■□□□□□ | ■□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★★★	数週間以降	貧血	★★
	口内炎	★		しびれ	★
数日から数週間	食欲不振	★		爪の変形	★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★	におい・味覚の変化	★	
	脱毛	★★★★	起こりやすさの目安		
	好中球減少	★★	★ 30%未満		
	出血	★	★★ 30%~60%		
			★★★ 60%以上		

※ キイトルーダの副作用に関しては、治療ハンドブックを参考にしてください
 ※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
 投与後 1 週間~2 週間：白血球減少および好中球減少

注意点

- パクリタキセルにはアルコールが含まれます。
(ビールに換算してコップ 1 杯程度)
- レスタミンの副作用で眠気が出る場合があります。
(外来で治療を受けるとき、車の運転はお避けください)
- 関節痛や筋肉痛が起こる場合があります。その都度お知らせください。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。

※退院時には発熱した場合(38℃以上)の抗生剤の飲み薬をお渡しします。