

食道：(SH)パムリスマブ +FP(LV2)/3wks(注射アカリス)

点滴

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 500mL			2 時間
① の側管から	② 生理食塩液 100mL	キイトルーダ	抗がん剤	30 分
	③ 生理食塩液 50mL			15 分
	④ 生理食塩液 250mL	アロカリス、パロノセトロン、デキサート	吐き気止め	30 分
⑤	ソルデム 1 500mL	KCL、硫酸 Mg	K、Mg の補充	60 分
⑥	マンニトール 300mL		利尿剤	60 分
⑦	生理食塩液 250mL	シスプラチン	抗がん剤	60 分
⑧	ソルデム 3 500mL		血管を洗い流す	60 分
⑨	生理食塩液	フルオロウラシル 持続注	抗がん剤	120 時間
合計			点滴時間：126 時間	

飲み薬

	1日目(点滴当日)	2日目(翌日)	3日目	4日目
デカドロン (吐き気止め)	なし	朝食後 1錠 夕食後 1錠	朝食後 1錠 夕食後 1錠	朝食後 1錠 夕食後 1錠
				

- 点滴は3週間に1回行います。
- 症状によって変更することがあります。

主な副作用

※ 下記はFP療法の副作用になります。
キイトルーダの副作用については説明冊子を
参考にしてください。

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★★★	数週間以降	貧血	★
	口内炎	★★		しびれ	★
数日から数週間	食欲不振	★★		爪の変形	★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★	起こりやすさの目安		
	白血球減少	★★★★	★	30%未満	
	出血	★	★★	30~60%	
			★★★★	60%以上	

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後1週間~2週間：白血球減少および好中球減少
投与後3週間：血小板減少

注意点

- シスプラチンは腎臓に負担がかかるため、点滴開始までに1L程度の水分補給を行ってください。また、点滴後も水分摂取を心がけて下さい。
- 発熱、咳、呼吸困難感(間質性肺炎の初期症状)等がありましたら、すぐにお知らせください。
- 感染予防を行ってください。(外出時のマスク着用、手洗いうがい等)
- 点滴中は、点滴が漏れていないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。