

食道：DTX70／3wks

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	グラニセトロンバッグ 100mL	グラニセトロン デキサート	吐き気止め	30 分
②	5%ブドウ糖液 250mL	ドセタキセル	抗がん剤	60 分
③	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15 分
合計	400mL	点滴時間 およそ 1 時間 45 分		

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

- 点滴は 3 週間に 1 回の予定です。
- 3 週間をひとかたまりとして繰り返します。
- 症状によって変更することがあります。

ドセタキセル | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★★
数日から数週間	口内炎	★		関節痛・筋肉痛	★★
	食欲不振	★★		手足のむくみ	★★
	下痢	★		爪の変形	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★★		起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%～60% ★★★ 60%以上	
	白血球減少	★★★★			
	出血	★			

- ※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
- 投与後 1 週間～2 週間：白血球減少および好中球減少
- 投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。