

胃：RAM/2wks

### 点滴

順序	輸液	作用薬	作用	点滴時間
①	生理食塩液 50mL	ポララミン	アレルギー予防	15分
②	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	15分
③	生理食塩液 250mL	サイラムザ	抗がん剤	1時間
④	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分
合計	400mL	点滴時間 およそ1時間 45分		

※ 薬の量はあなたの体格(体重)によって決まります。

### 今後の予定

- 点滴は2週間に1回行う予定です。
- 症状によって、変更することがあります。

サイラムザ | ■□□□□□□ | □□□□□□□ |

### 主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★	数週間以降	貧血	★
	口内炎	★		高血圧	★
数日から数週間	食欲不振	★		頭痛	★
	下痢	★		たんぱく尿	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	—		起こりやすさの目安	
	白血球減少	—	★ 30%未満		
出血	★	★★ 30%~60%			
			★★★ 60%以上		

- ※ 副作用の出かたには個人差があります。
- 投与後 1 週間~2 週間：白血球減少および好中球減少
- 投与後 3 週間：血小板減少

### 注意点

- ポララミンの副作用で眠気が出る場合があります。  
(外来で治療を受けるとき、車の運転はお避けください。)
- 治療を続けていると血圧が上昇することがあります。  
自宅でも血圧測定を継続し、日誌に記載してください。
- ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。