

胃：RAM+Nab-PTX/4wks

点滴

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

1 日目、15 日目

順序	輸液	作用薬	作用	点滴時間
①	生理食塩液 50mL	ポラミン	アレルギー予防	15 分
②	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	15 分
③	生理食塩液 250mL	サイラムザ	抗がん剤	1 時間 (⇒30 分)
④	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	30 分 (15 分)
⑤	グラニセトロンバッグ 100mL	グラニセトロン デキサート	吐き気止め	15 分
⑥	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	15 分
⑦	生理食塩液 50mL	アブラキサン	抗がん剤	30 分
⑧	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15 分
合計	650mL	点滴時間 およそ 3 時間 15 分 (2 回目以降 およそ 2 時間 30 分)		

8 日目

順序	輸液	作用薬	作用	点滴時間
①	グラニセトロンバッグ 100mL	グラニセトロン デキサート	吐き気止め	30 分
②	生理食塩液 50mL	アブラキサン	抗がん剤	30 分
③	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15 分
合計	200mL	点滴時間 およそ 1 時間 15 分		

○4 週間をひとかたまりとして繰り返します。
○症状によって、変更することがあります。

サイラムザ | ■□□□□□ | □□□□□□ | ■□□□□□ | □□□□□□ |
アブラキサン | ■□□□□□ | ■□□□□□ | ■□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
数日から数週間	口内炎	★		しびれ	★★
	食欲不振	★★		高血圧	★
	下痢	★		たんぱく尿	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★	起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%~60% ★★★ 60%以上		
	白血球減少	★★★			
	出血	★			

※ 副作用の出かたには個人差があります。
投与後 1 週間~2 週間：白血球減少および好中球減少
投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- ポラミンの副作用で眠気が出る場合があります。
(外来で治療を受けるとき、車の運転はお避けください。)
- 関節痛が起こる場合があります。その都度お知らせください。
- 治療を続けていると血圧が上昇することがあります。
自宅でも血圧測定を継続し、日誌に記載してください。
- ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。