

胃：RAM+PTX／4wks

点滴

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

1日目、15日目

順序	輸液	作用薬	作用	点滴時間
①	生理食塩液 50mL	ポラミン	アレルギー予防	15分
②	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	15分
③	生理食塩液 250mL	サイラムザ	抗がん剤	1時間
④	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	30分 (15分)
⑤	グラニセトロンバッグ 100mL	グラニセトロン デキサート ガスター	吐き気止め アレルギー予防	30分 (15分)
⑥	5%ブドウ液 250mL	パクリタキセル	抗がん剤	1時間
⑦	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分
合計	800mL	点滴時間 およそ3時間45分 (2回目以降 およそ3時間15分)		

8日目

順序	輸液	作用薬	作用	点滴時間
①	グラニセトロンバッグ 100mL	グラニセトロン デキサート ガスター ポラミン	吐き気止め アレルギー予防	30分
②	5%ブドウ液 250mL	パクリタキセル	抗がん剤	1時間
③	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分
合計	400mL	点滴時間 およそ1時間45分		

○4週間をひとかたまりとして繰り返します。

○症状によって、変更することがあります。

サイラムザ | ■□□□□□ | □□□□□□ | ■□□□□□ | □□□□□□ |
パクリタキセル | ■□□□□□ | ■□□□□□ | ■□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
数日から数週間	口内炎	★		しびれ	★★★★
	食欲不振	★★		高血圧	★
	下痢	★		たんぱく尿	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★★		起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%～60% ★★★ 60%以上	
	白血球減少	★★★★			
	出血	★			

※ 副作用の出かたには個人差があります。

投与後1週間～2週間：白血球減少および好中球減少

投与後3週間：血小板減少

注意点

○パクリタキセルにはビールに換算してコップ1杯程度のアルコールが含まれます。

○ポラミンの副作用で眠気が出る場合があります。

(外来で治療を受けるとき、車の運転はお避けください。)

○関節痛が起こる場合があります。その都度お知らせください。

○治療を続けていると血圧が上昇することがあります。

自宅でも血圧測定を継続し、日誌に記載してください。

○ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。