

# 胃：ニボルマブ+SOX/3wks(注射アロカリス)

## 点滴

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50mL			15分
②	生理食塩液 100mL	オブジーボ	抗がん剤	30分
③	生理食塩液 50mL			15分
④	生理食塩液 100mL	アロカリス パロノセトロン デキサート (ポララミン)	吐き気止め (アレルギー予防)	30分
⑤	5%ブドウ糖液 250mL	エルプラット	抗がん剤	2時間
⑥	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分
合計	600mL	点滴時間 およそ3時間 45分		

## 主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★★	数週間以降	貧血	★
	冷たさ過敏	★★★★		しびれ	★
数日から数週間	口内炎	★★★		爪の変形	★
	食欲不振	★		色素沈着	★★
	下痢	★		におい・味覚の変化	★★
	便秘	★		起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%~60% ★★★ 60%以上	
	脱毛	★			
	白血球減少	★★★★			
	出血	★			

※ オブジーボの副作用については説明冊子を参考にしてください。

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。

投与後 1 週間~2 週間：白血球減少および好中球減少、投与後 3 週間：血小板減少

## のみ薬

	飲み方	効果
ティーエスワン配合OD錠T	1日2回 朝夕食後(1回 錠)	抗がん剤

デカドロン (吐き気止め)	1日目(点滴当日)	2日目		3日目	
	なし	朝食後 4錠	夕食後 4錠	朝食後 4錠	夕食後 4錠
					

○点滴は3週間に1回の予定です。

○ティーエスワンは点滴日の夕食後から2週間内服し、その後1週間休薬します。

○3週間をひとかたまりとして繰り返します。(症状によって変更することがあります)

## 注意点

○点滴中・点滴後にかゆみ、発疹、息苦しさ等を感じた時はすぐにお知らせください。エルプラットによるアレルギー症状は、初めて点滴したときに現れる場合と、何サイクルか繰り返した後で起こる場合があります。

⇒4回目の点滴より、アレルギー予防のポララミンを追加します。

ポララミンにより眠気が出るので、当日車の運転は避けてください。

○冷たいものに触れたり飲食したりすると、しびれや痛みを感じるようになります。点滴後1週間ほどは、冷たいものを避けてください。

○ティーエスワンの服薬記録表にて内服確認を行ってください。

○点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。

○その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。

オブジーボ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |  
 エルプラット | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |  
 ティーエスワン | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | □□□□□□ |