

胃：ニボルマブ+XELOX/3wks(注射アロカリス)





点滴

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50mL			15分
②	生理食塩液 100mL	オブジーボ	抗がん剤	30分
③	生理食塩液 50mL			15分
④	生理食塩液 100mL	アロカリス パロノセトロン デキサート (ポララミン)	吐き気止め (アレルギー予防)	30分
⑤	5%ブドウ糖液 250mL	エルプラット	抗がん剤	2時間
⑥	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分
合計	600mL	点滴時間 およそ3時間 45分		

のみ薬

	飲み方	効果
ゼローダ錠 300mg	1日2回 朝夕食後(1回 錠)	抗がん剤

デカドロン (吐き気止め)	1日目(点滴当日)	2日目		3日目	
	なし	朝食後 4錠	夕食後 4錠	朝食後 4錠	夕食後 4錠
					

- 点滴は3週間に1回の予定です。
- ゼローダは点滴日の夕食後から2週間内服し、その後1週間休薬します。
- 3週間をひとかたまりとして繰り返します。(症状によって変更することがあります)

オブジーボ、エルプラット | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |
ゼローダ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
	冷たさ過敏	★★★★		しびれ	★★★★
数日から数週間	口内炎	★★		手足のチクチク感	★★★★
	食欲不振	★		色素沈着	★★
	下痢	★		におい・味覚の変化	★★
	便秘	★		起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%~60% ★★★ 60%以上	
	脱毛	★			
	白血球減少	★★★★			
出血	★				

- ※ オブジーボの副作用については説明冊子を参考にしてください。
- ※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後1週間~2週間：白血球減少および好中球減少、投与後3週間：血小板減少

注意点

- 点滴中・点滴後にかゆみ、発疹、息苦しさ等を感じた時はすぐにお知らせください。エルプラットによるアレルギー症状は、初めて点滴したときに現れる場合と、何サイクルか繰り返した後で起こる場合があります。
⇒4回目の点滴より、アレルギー予防のポララミンを追加します。
ポララミンにより眠気が出るので、当日車の運転は避けてください。
- 冷たいものに触れたり飲食したりすると、しびれや痛みを感じるようになります。点滴後1週間ほどは、冷たいものを避けてください。
- ゼローダによる手足症候群を予防するため、手足の保湿を十分に行ってください。服薬日誌にて、服薬確認・副作用チェックを行ってください。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。