

大腸：BEV(5mgkg)+IRIS/4wks(注射アロカリス)

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	点滴時間
①	生理食塩液 100mL	ベバシズマブ	抗がん剤	30分 →(10分)
②	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す	15分
③	生理食塩液 100mL	アロカリス パロノセトロン デキサート	吐き気止め	30分
④	5%ブドウ糖液 500mL	イリノテカン	抗がん剤	90分
⑤	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

のみ薬

薬の名前	のみ方	効果
ティーエスワン	1日2回 朝夕食後	抗がん剤

今後の予定

- 点滴は2週間に1回の予定です。
- ティーエスワンは点滴当日の夕食後から2週間内服し、2週間お休みします。
- 症状や医師の指示によって変更することがあります。

点滴 | ■□□□□□ | □□□□□□ | ■□□□□□ | □□□□□□ |
 ティーエスワン | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | □□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	手足のチクチク感	★
	口内炎	★★		色素沈着	★★
数日から数週間	食欲不振	★★		涙目	★
	下痢	★★★★		高血圧	★★
	脱毛	★★		起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%~60% ★★★ 60%以上	
	白血球減少	★★★★			
	血小板減少	★★			
貧血	★★				

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
 投与後1週間~2週間：白血球減少および好中球減少
 投与後3週間：血小板減少

注意点

- グレープフルーツジュースを飲むと副作用が強くなることもあるのでお避けください。
- 突然起こる腹痛、頭痛、吐血、下血などが出現した時は、すぐにお知らせください。
- ⇒「ベバシズマブ緊急連絡カード」を常に携帯しておいてください。
- 血圧が高くなることがあります。毎日、血圧測定をお願いします。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。