

大腸：BEV(5mg/kg)+mFOLFOX6／2wks(注射アカリス)

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50mL			15分
②	生理食塩液 100mL	ベバシズマブ	抗がん剤	初回 30分 (→10分)
③	生理食塩液 50mL			15分
④	生理食塩液 100mL	アロカリス パロノセトロン デキサート	吐き気止め	30分
⑤	5%ブドウ糖液 250mL	エルプラット	抗がん剤	2時間
⑤ ※側管から エルプラット と同時投与	5%ブドウ糖液 250mL	レボホリナート	カルシウムの効果 を高める	2時間
⑥	生理食塩液 50mL	フルオロウラシル	抗がん剤	(約5分)
⑦	生理食塩液 250mL	フルオロウラシル 持続注	抗がん剤	46時間

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

- 点滴は2週間に1回行い、2週間をひとかたまりとして繰り返します。
- 症状によって変更することがあります。

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★★
	冷たさ過敏	★★★		しびれ	★★
数日から数週間	口内炎	★★		手足の力加減感	★
	食欲不振	★		色素沈着	★
	下痢	★★		におい・味覚の変化	★
	便秘	★		起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%~60% ★★★ 60%以上	
	脱毛	★			
	白血球減少	★★★			
	出血	★			

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。

注意点

- 点滴中・点滴後にかゆみ、発疹、息苦しさ等を感じた時はすぐにお知らせください。エルプラットによるアレルギー症状は、初めて点滴したときに現れる場合と、何サイクルか繰り返した後で起こる場合があります。
⇒6回目の点滴より、アレルギー予防のポララミンを追加します。
ポララミンにより眠気が出るので、当日車の運転は避けてください。
- 冷たいものに触れたり飲食したりすると、しびれや痛みを感じるようになります。点滴後1週間ほどは、冷たいものを避けてください。
- 血圧の上昇、足のむくみ、腹部痛、吐き気、手足の痛みなどが出現した時は、すぐにお知らせください。
⇒「ベバシズマブ緊急連絡カード」を常に携帯しておいてください。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。