

大腸：Cmab+CPT-11/2wks(注射アロカリス)

点滴

1日目	8日目	輸液	作用薬	効果	時間
①	①	生理食塩液 50mL	デキサート ポラミン	アレルギー予防	15 分
②	②	生理食塩液 50mL			15 分
③	③	生理食塩液 500mL	アービタックス	抗がん剤	2 時間 →2 回目以降 1 時間
④	④	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	30 分
⑤	—	生理食塩液 100mL	アロカリス パノセトロン デキサート	吐き気止め	30 分
⑥	—	5%ブドウ糖液 500mL	イリノテカン	抗がん剤	90 分
⑦	—	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15 分

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。
※ イリノテカンの投与量は初回 400 mg/m²、2 回目以降 250 mg/m² です。

今後の予定

- 点滴は 1 週間に 1 回です。
アービタックス (①～④) は毎週、
イリノテカン (⑤～⑦) は 2 週間に 1 回行います。
○2 週間をひとかたまりとして繰り返します。
○症状によって変更することがあります。

アービタックス | ■□□□□□ | ■□□□□□ |
イリノテカン | ■□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	爪の変化(爪囲炎)	★★
数日から数週間	口内炎	★		皮膚乾燥	★★
	食欲不振	★★		ざ瘡様皮膚炎・発疹	★★★
	下痢	★★		目の異常(角膜炎)	★
	便秘	★		低カルシウム血症	★★
	白血球減少	★★★	起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%～60% ★★★ 60%以上		
	皮膚のかゆみ	★★			

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。

注意点

- グレープフルーツジュースを飲むと副作用が強く出ることがあるのでお避けください。
- ポラミンの副作用で眠気が出る場合があります。
(外来で治療を受けるとき、車の運転はお避けください)
- 点滴後 24 時間 (特に最初の 2 時間) は過敏症状 (発熱、寒気、発疹、息苦しさなど) が起こることがまれにあります。
その場合はすぐに知らせてください。
- ごくまれに間質性肺炎が起こることがあります。
(初期症状：息切れ、呼吸がしにくい、咳、熱など)
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。