

大腸：mFOLFOX6／2wks(注射アカリ)

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50mL			15分
②	生理食塩液 100mL	アロカリス パロノセトロン デキサート	吐き気止め	30分
③	5%ブドウ糖液 250mL	エルプラット	抗がん剤	2時間
③ ※側管から エルプラット と同時投与	5%ブドウ糖液 250mL	レボホリナート	5-FU の効果を 高める	
④	生理食塩液 50mL	フルオロウラシル	抗がん剤	(約5分)
⑤	生理食塩液	フルオロウラシル 持続注	抗がん剤	46時間

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

- 点滴は2週間に1回行い、2週間をひとかたまりとして繰り返します。
- 症状によって変更することがあります。

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
	冷たさ過敏	★★★★		しびれ	★★
数日から数週間	口内炎	★★		手足のチクチク感	★
	食欲不振	★		色素沈着	★
	下痢	★★		におい・味覚の変化	★
	便秘	★		起こりやすさの目安	
	脱毛	★		★ 30%未満	
	白血球減少	★★★★	★★ 30%~60%		
	出血	★	★★★ 60%以上		

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
 投与後 1 週間～2 週間：白血球減少および好中球減少
 投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- 点滴中・点滴後にかゆみ、発疹、息苦しさ等を感じた時はすぐにお知らせください。エルプラットによるアレルギー症状は、初めて点滴したときに現れる場合と、何サイクルか繰り返した後で起こる場合があります。
 ⇒6 回目の点滴より、アレルギー予防のポラミンを追加します。
 ポラミンにより眠気が出るので、当日車の運転は避けてください。
- 冷たいものに触れたり飲食したりすると、しびれや痛みを感じるようになります。点滴後 1 週間ほどは、冷たいものを避けてください。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。