

大腸：Pmab+mFOLFOX6／2wks(注射アロカリス)

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50mL			15 分
②	生理食塩液 50mL	ポララミン デキサート	アレルギー予防 吐き気止め	15 分
③	生理食塩液 50mL			15 分
④	生理食塩液 100mL	ベクティビックス	抗がん剤	1 時間
⑤	生理食塩液 50mL			30 分
⑥	生理食塩液 100mL	アロカリス パロノセトロン デキサート	吐き気止め	30 分
⑦	5%ブドウ糖液 250mL	エルブラット	抗がん剤	2 時間
⑦ ※側管から エルブラット と同時投与	5%ブドウ糖液 250mL	レボホリナート	カルシウムの効果を 高める	2 時間
⑧	生理食塩液 50mL	フルオロウラシル	抗がん剤	(約 5 分)
⑨	生理食塩液 250mL	フルオロウラシル 持続注	抗がん剤	46 時間

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

- 点滴は2週間に1回行い、2週間をひとかたまりとして繰り返します。
- 症状によって変更することがあります。

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	爪の変化 (爪囲炎)	★
	冷たさ過敏	★★★		ざ瘡用皮膚炎、 発疹	★★★★
数日から数週間	口内炎	★★		しびれ	★★
	食欲不振	★		目の異常 (角膜炎)	★
	下痢	★★		低マグネシウム血症	★
	便秘	★	起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%～60% ★★★ 60%以上		
	脱毛	★★			
	白血球減少	★★★			
	皮膚のかゆみ	★			

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。

注意点

- 点滴中・点滴後は過敏症状（発熱、寒気、かゆみ、発疹、息苦しさ等）が起こることがあります。その場合はすぐにお知らせください。
- ポララミンの副作用により眠気が出る場合があります。
- 冷たいものに触れたり飲食したりすると、しびれや痛みを感じるようになります。点滴後1週間ほどは、冷たいものを避けてください。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。