

大腸：RAM+FOLFIRI／2wks(注射アカリス)

点滴

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50mL		ルートキープ用	15 分
②	生理食塩液 100mL	アロカリス パロノセトロン デキサート ポララミン	吐き気止め アレルギー予防	30 分
③	生理食塩液 250mL	サイラムザ	抗がん剤	60 分 →30 分
④	生理食塩液 50mL			15 分
⑤	5%大塚糖液 250mL	イリノテカン	抗がん剤	90 分
⑤ (側管 イリ ノテカンと同 時投与)	5%大塚糖液 250mL	レボホリナート	5-FU の効果を 高める	2 時間
⑥	生理食塩液 50mL	フルオロウラシル注	抗がん剤	(約 5 分)
⑦	生理食塩液	フルオロウラシル 持続注	抗がん剤	46 時間

今後の予定

- 点滴は2週間に1回行い、2週間をひとかたまりとして繰り返します。
- 症状によって変更することがあります。

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	悪心、嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
	疲労	★★		蛋白尿	★
数日から数週間	口内炎	★★		高血圧	★★
	食欲不振	★★		起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%～60% ★★★ 60%以上	
	下痢	★★			
	便秘	★			
	脱毛	★			
	好中球減少	★★			
	血小板減少	★			

- ※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
 投与後 1 週間～2 週間：白血球減少および好中球減少
 投与後 3 週間：血小板減少
 ※ RAISE 試験データを元に作成

注意点

- グレープフルーツジュースを飲むと副作用が強くなることもあるためお避けください。
- 血圧が高くなることがあります。毎日、血圧測定をお願いします。
- 鼻出血が起こりやすくなります。10-15 分圧迫しても止血できない時はお知らせください。
- 腹痛、頭痛、吐血、下血などが突然出現した時は、すぐにお知らせください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。