

大腸：TAS+BEV／4wks

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	点滴時間
①	生理食塩液 50mL		ルート確保用	15分
②	生理食塩液 100mL	ペバシズマブ	抗がん剤	30分→ (10分)
③	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分

のみ薬

薬の名前	のみ方	効果
ロンサーフ	1日2回 朝夕食後 (点滴当日夕から)	抗がん剤

今後の予定

- 点滴は2週間に1回の予定です。
- ロンサーフは点滴当日の夕食後から5日間内服し、2日間お休みします。これを2回繰り返します。その後さらに14日間お休みします。
- 症状や医師の指示によって変更することがあります。

ペバシズマブ | ■□□□□□ | □□□□□□ | ■□□□□□ | □□□□□□ |
 ロンサーフ | ■■■■■□□ | ■■■■■□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数日から数週間	貧血	★★★★
	口内炎	★		鼻出血	★
数日から数週間	食欲不振	★★		蛋白尿	★★
	下痢	★★		起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%~60% ★★★ 60%以上	
	便秘	★			
	脱毛	★			
	白血球減少	★★★★			
出血	★★				

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
 投与後1週間~2週間：白血球減少および好中球減少
 投与後3週間：血小板減少

注意点

- 突然起こる腹痛、頭痛、吐血、下血などが出現した時は、すぐにお知らせください。
- ⇒「ペバシズマブ緊急連絡カード」を常に携帯しておいてください。
- 血圧が高くなることがあります。毎日、血圧測定をお願いします。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。