

胆:GEM+CDDP+S-1 /2wks(注射アカリ)

点滴

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	ソリューゲン F 500mL		水分負荷	90 分
①-1 (①開始 1 時間後)	生理食塩液 100mL	アロカリス パロノセトロン デキサート	吐き気止め	(30 分)
②	5%ブドウ糖液 100mL	ゲムシタピン	抗がん剤	30 分
③	生理食塩液 500mL	シスプラチン	抗がん剤	90 分
④	マンニトール 300mL		利尿剤	60 分
⑤	ソリューゲン F 500mL	メトクロプラミド	吐き気止め 水分負荷	90 分
⑥	ソリューゲン F 500mL	メトクロプラミド	吐き気止め 水分負荷	90 分
合計	2500mL	点滴時間 およそ 7 時間 30 分		

★点滴当日は、③シスプラチンの点滴までに、経口補水液を 500mL 飲水してください。

のみ薬

作用薬	のみ方	効果
ティーエスワン配合 OD 錠	1 日 2 回 朝夕食後	抗がん剤

今後の予定

- 点滴は 2 週間に 1 回行います。
- ティーエスワンは点滴日夕食後から 7 日間服用し、7 日間休薬します。
- 2 週間をひとかたまりとして繰り返します（症状によって変更することがあります）。

点滴 | ■□□□□□ | □□□□□□ |
ティーエスワン | ■■■■■■ | □□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★★
数日から数週間	口内炎	★		しびれ	★
	食欲不振	★★		爪の変形	★
	下痢	★★		色素沈着	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★	起こりやすさの目安		
	白血球減少	★★★			
	出血	★			
			★	30%未満	
			★★	30%～60%	
			★★★	60%以上	

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後 1 週間～2 週間：白血球減少および好中球減少
投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- シスプラチンにより腎臓に負担がかかることがあるので、経口補水液（アクアサポートまたは OS-1）にて水分摂取を心がけてください。
点滴当日：③点滴までに 1 本、点滴後も可能であれば 1 本
点滴翌日、翌々日：1 日 3 本
- ティーエスワンの主な副作用は粘膜障害（下痢、口内炎、皮膚障害など）です。服薬日誌にて、服薬確認と副作用チェックを行ってください。
- 外出時のマスク着用や手洗いうがいなど、感染予防を行ってください。
- ごくまれに間質性肺炎が起こることがあります。
（初期症状：息切れ、呼吸がしにくい、咳、熱など）
症状があらわれた場合は、すぐにお知らせください。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。