

NSCLC : Pembro+CDDP(SH)+PEM/3w k s

点滴

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50mL			10分
②	生理食塩液 50mL	キイトルーダ	抗がん剤	30分
③	生理食塩液 50mL			10分
④	生理食塩液 100mL	アロカリス パロノセトロン デキサート	吐き気止め	30分
⑤	生理食塩液 100mL	ペメトレキセド	抗がん剤	10分
⑥	ソルデム1 500mL	KCL、硫酸 Mg	K、Mg の補充	60分
⑦	マンニトール 300mL		利尿剤	60分
⑧	生理食塩液 250mL	シスプラチン	抗がん剤	60分
⑨	ソルデム3 500mL		血管を洗い流す	60分
合計	1900mL	点滴時間：5時間 10分		

飲み薬

	1日目(点滴当日)	2日目	3日目	4日目
デカドロン (吐き気止め)	なし	朝食後 1錠 昼食後 1錠	朝食後 1錠 昼食後 1錠	朝食後 1錠 昼食後 1錠
				

- 点滴は3週間に1回行います。
- 症状によって変更することがあります。

主な副作用(キイトルーダは冊子参照)

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★★	数週間以降	貧血	★★
	口内炎	★		しびれ	★
数日から数週間	食欲不振	★★★		爪の変形	★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★		起こりやすさの目安	
	白血球減少	★★	★ 30%未満		
	血小板減少(出血傾向)	★	★★ 30%~60%		
			★★★ 60%以上		

- ※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
- 投与後 1 週間~2 週間：白血球減少および好中球減少
- 投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- シスプラチン開始までに 1L 程度の水分補給を行ってください。
- ★副作用予防にバンビタン末を毎日忘れずに服用してください。
- ★副作用予防にメチコバル注射を9週間ごとに行います。
- 発熱、咳、呼吸困難感(間質性肺炎の初期症状)等がありましたら、すぐにお知らせください。
- 感染予防を行ってください。(外出時のマスク着用、手洗いうがい等)
- 点滴中は、点滴が漏れていないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。