

# NSCLC：ペムブロリズマブ+PEM+CBDCA/3wks

## 点滴

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

1日目	輸液	作用薬	作用	点滴時間
①	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	10分
②	生理食塩液 50mL	キイトルーダ	抗がん剤	30分
③	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	10分
④	生理食塩液 50mL	パロノセトロン デキサート	吐き気止め	15分
⑤	生理食塩液 50mL	ペメトレキシド	抗がん剤	10分
⑥	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	30分
⑦	5%ブドウ液 250mL	カルボプラチン	抗がん剤	1時間
⑧	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	10分

## 飲み薬

2、3日目	のみ方	効果
デカドロン錠 4mg	1日2回 朝食後に1錠ずつ (点滴した翌日から開始)：2日間	吐き気止め

○3週間をひとかたまりとして繰り返します。

○症状によって、変更することがあります。

キイトルーダ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |  
 ペメトレキシド | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |  
 カルボプラチン | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |

## 主な副作用（キイトルーダは冊子参照）

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★★
	口内炎	★		しびれ	★
数日から数週間	食欲不振	★★		筋肉痛・関節痛	★
	下痢	★		爪の変形	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★		起こりやすさの目安	
	白血球減少	★★★★		★ 30%未満	
	出血傾向 (血小板減少)	★★		★★ 30%~60%	
			★★★ 60%以上		

※ 副作用の出かたには個人差があります。

投与後 1 週間~2 週間：白血球減少および好中球減少

投与後 3 週間：血小板減少

## 注意点

○外出時のマスク着用や手洗いうがいなど、感染予防を行ってください。

○手足のしびれがあらわれる場合があります。治療を続けていくと症状が強くなる場合がありますので、お知らせください。

○パンビタンは連日、メチコバルは9週間に1回注射します。

○ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。

○点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。

○その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。