

SCLC : Durva+CBDCA+VP-16/3w k s

点滴

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

1日目

順序	輸液	作用薬	作用	点滴時間
①	生理食塩液 250mL	イミフィンジ	抗がん剤	1 時間
②	グラニセトロンバッグ 100mL	グラニセトロン デキサート	吐き気止め	15 分
③	5%糖液 250mL	カルボプラチン	抗がん剤	1 時間
④	5%糖液 500mL	エトポシド	抗がん剤	90 分
⑤	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15 分
				点滴時間 およそ 4 時間

2日目、3日目

順序	輸液	作用薬	作用	点滴時間
①	グラニセトロンバッグ 100mL	グラニセトロン デキサート	吐き気止め	15 分
②	5%糖液 500mL	エトポシド	抗がん剤	90 分
③	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15 分
				点滴時間 およそ 2 時間

今後の予定

○カルボプラチン、イミフィンジは 1 日目に、エトポシドは 1~3 日目に点滴します。

○3 週間をひとかたまりとして繰り返します。

○症状によって、変更することがあります。

イミフィンジ | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |
 カルボプラチン | ■□□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |
 エトポシド | ■■□□□□ | □□□□□□ | □□□□□□ |

主な副作用（イミフィンジは別紙参照）

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
	口内炎	★		しびれ	★
数日から数週間	食欲不振	★★		爪の変形	★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★★		起こりやすさの目安	
	白血球減少	★★★★	★ 30%未満		
出血	★	★★ 30%~60%			
			★★★ 60%以上		

※ 副作用の出かたには個人差があります。
 投与後 1 週間~2 週間：白血球減少および好中球減少
 投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- エトポシドによる血管炎が起こる場合があります。
投与中に血管痛などの症状があれば、すぐにお知らせください。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- 外出時のマスク着用や手洗いうがいなど、感染予防を行ってください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。