

子宮頸癌:チソツマブ ベドチン/3wks

点滴

※薬の量はあなたの体格(身長・体重)などによって決まります。

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50 mL	デキサート	吐き気予防 過敏症予防	15分
②	生理食塩液 100 mL	テブダック	抗がん剤	30分
③	生理食塩液 50 mL		血管を洗い流す	15分
合計	200 mL	点滴時間	およそ1時間	

目薬

テブダックの投与					
	投与前日	投与日	投与1日後	投与2日後	投与3日後以降
サンベタゾン 眼耳鼻科用液 0.1%	○	○ 1日3回 両眼	○	○	
アイファガン 点眼液0.1%		○ 投与直前に 両眼			
ヒアレイン点眼 液0.1%		○	○ 1日3回 両眼	○	○

今後の予定

点滴は3週間に1回です。3週間をひとかたまりとして繰り返します。

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ		
数日	倦怠感	★	数週間以降	貧血	★		
	吐き気・嘔吐	★★		しびれ	★★		
数日から数週間	食欲不振	★	起こりやすさの目安				
	下痢	★				★	30%未満
	便秘	★				★★	30~60%
	脱毛	★				★★★	60%以上
	白血球減少	★					
	出血	★★					

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後1週間~2週間:白血球減少および好中球減少
投与後3週間:血小板減少

注意点

- 眼障害対策の目薬をしっかり行いましょう。
- テブダック投与5分前~投与後30分は冷却アイマスクを使用します。
- ごく稀に心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れていないか気を付けて下さい。
- その他、何か変わったことがありましたら、すぐにお知らせ下さい。