

子宮頸・体癌:Pembro+TC/3wks

点滴

※薬の量はあなたの体格(身長・体重)などによって決まります。

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50 mL		血管を洗い流す	15分
②	生理食塩液 100 mL	キイトルーダ	抗がん剤	30分
③	生理食塩液 50 mL		血管を洗い流す	15分
	のみくすり⇒	レスタミン5錠	過敏症予防	
④	生理食塩液 100 mL	アロカリス パロノセトロン デキサート ガスター	吐き気予防 過敏症予防 過敏症予防	30分
⑤	5%糖液 500 mL	パクリタキセル	抗がん剤	3時間
⑥	5%糖液 250 mL	カルボプラチン	抗がん剤	1時間
⑦	生理食塩液 50 mL		血管を洗い流す	15分
	合計1100mL	点滴時間	5時間45分	

のみ薬

デカドロン錠
(吐き気予防)



点滴当日(1日目)	2日目		3日目		4日目	
	朝	夕	朝	夕	朝	夕
	4錠	4錠	4錠	4錠	4錠	4錠
	1日2回 1回4錠を朝夕食後(3日間)					

今後の予定

点滴は3週間に1回です。3週間をひとかたまりとして繰り返します。

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
数日から数週間	口内炎	★		しびれ	★★
	食欲不振	★★		爪の変形	★
	下痢	★		色素沈着	★
	便秘	★	におい・味覚の変化	★	
	脱毛	★★★	起こりやすさの目安		
	白血球減少	★★★	★ 30%未満		
	出血	★	★★ 30~60%		
			★★★ 60%以上		

※キイトルーダの副作用に関しては、キイトルーダ治療ハンドブックを参考にしてください。

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後1週間~2週間:白血球減少および好中球減少
投与後3週間:血小板減少

注意点

- 点滴にはアルコールが缶ビール1本程度含まれます。
- レスタミン錠の副作用で眠気が出る場合があります。
(外来で治療を受けるとき、車の運転は避けて下さい。)
- ごく稀に心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れていないか気を付けて下さい。
- その他、何か変わったことがありましたら、すぐにお知らせ下さい。
- 他の病院を受診されるときは この用紙をお持ちになり、抗がん剤で治療中であることを医師にお伝え下さい。